

BIOPAROX ®

И А Л
ОДОБРЕНО!
ДАТА 04.07.06

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Информация за употреба, прочетете внимателно!

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

BIOPAROX ®

БИОПАРОКС ®

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна съставка:

Fusafungine 50 mg за 10 ml разтвор

Всяко **впръскване съдържа 25 µl** от разтвора, еквивалентно на 0.125 mg fusafungine.

Помощни вещества:

ароматична съставка 14868, анхидриден етанол, захарин, изопропилмиристат, Норфлуран (HFA – 134a)

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ

Орален и назален спрей, разтвор.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА :

LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier

92200 Neuilly sur Seine

FRANCE

ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ:

EGIS, Pharmaceutical Ltd,

1106 Budapest

Hungaria

и

Les Laboratoires SERVIER Industrie

45520 GIDY

FRANCE

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Локален антибиотик с противовъзпалителни свойства.

Терапевтични показания

Локален антибиотик с противовъзпалителни свойства за лечение на инфекции и възпалителни процеси на горните дихателни пътища



ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

БИОПАРОКС® е противопоказан в случай на свръхчувствителност към съставките на лекарството и при деца под 30 месечна възраст.

Информирайте Вашия лекар преди да вземете това лекарство ако имате някое от гореизброените състояния.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

БИОПАРОКС® не трябва да се използва повече от 10 дни, тъй като може да увреди нормалното равновесие на микробиологичната флора.

Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт за съвет.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Препоръчително е да информирате вашия лекар, ако приемате същевременно и други лекарства.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Да не се приема БИОПАРОКС® по време на кърмене и да се използва с особено внимание по време на бременност.

Попитайте вашия лекар или фармацевт за съвет преди да вземете каквото и да било лекарство.

ЕФЕКТ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ ИЛИ РАБОТА С МАШИНИ

БИОПАРОКС® не влияе върху способността за шофиране или работа с машини.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА

Освен ако лекарят не ви препоръча друго, обичайната дневна доза за **възрастни** е четири впръсквания в устата и 2 впръсквания във всяка ноздра 4 пъти дневно. За **деца** над 30 месечна възраст: от 2 до 4 впръсквания в устата и от 1 до 2 впръсквания във всяка ноздра 4 пъти дневно. Лечението не трябва да продължава повече от 10 дни.

Информирайте вашия лекар ако симптомите / или придружаващата температура продължават.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Орално и назално приложение



НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Поставете нужния накрайник /бял за устата, жълт или **прозрачен** за носа/ на флакона. Преди първата употреба, натиснете 4 пъти дозатора, за да напълните клапата. Флаконът трябва да се държи изправен между палеца и показалеца с насочен нагоре накрайник /виж фиг. 1/.

Фиг. 1



Прием през носа:

Изсекнете носа си преди употреба. Поставете жълтия или **прозрачния** накрайник върху флакона. Поставете жълтия или **прозрачния** накрайник във всяка ноздра по ред, тогава натиснете силно и до долу върху горния край на флакона докато вдишвате през носа /като сте затворили другата ноздра и държите устата си затворена/ /Виж фиг. 2 /


Фиг. 2



Прием през устата:

Поставете белия накрайник върху флакона. За да приемете медикамента, поставете белия накрайник в устата си, като затворите устните около него. Тогава натиснете силно и до долу върху горния край на флакона, докато вдишвате дълбоко. /Виж фиг. 3 и 4 /

Фиг. 3



Фиг. 4



Накрайниците за устата и носа трябва да се дезинфекцират всеки ден с памук, натопен в 90 % алкохол.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Възможни са локални преходни реакции като сухота в носа / в гърлото или пристъпи на кихане, които обикновено не налагат прекратяване на лечението.

Съобщава се за изолирани случаи, по-специално при пациенти с алергични тенденции, за локални реакции, обхващащи кожата или лигавиците като



оток, обрив, бронхоспазм. В такива случаи лечението трябва да бъде прекъснато и да се консултирате с лекар.

Информирайте Вашия лекар ако имате температура.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се излага на температура по-висока от 50°C. Да не се пръска в очите!

Забранено е да отваряте или хвърляте флакона в огън, дори когато е празен.

ПРЕПАРАТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛЗВА ПРЕДИ СРОКА НА ГОДНОСТ, МАРКИРАН ЯСНО ВЪРХУ ОПАКОВКАТА.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА
09/2005

